










ProvetS
Simoes

MeloxiPro 2,0 mg

Meloxicam

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA	Cada comprimido de 150 mg para cães contém: Meloxicam 2,0 mg Excipientes q.s.p 150,0 mg											
INDICAÇÕES	MeloxiPro é indicado para controle e redução da inflamação (ação anti-inflamatória), da febre (ação antipirética) e da dor (ação analgésica) em doenças musculoesqueléticas agudas e crônicas, em procedimentos cirúrgicos e em outros processos dolorosos e inflamatórios; em cães.											
POSOLOGIA	<p>O medicamento é de uso interno e deve ser administrado exclusivamente por via oral. O MeloxiPro possui duas apresentações, recomendadas de acordo com a indicação para cada espécie e faixa de peso dos animais a serem tratados.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Espécie</th> <th>Dias de tratamento</th> <th>Comprimidos</th> <th>Peso do animal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Cães </td> <td>No 1º dia de tratamento</td> <td>2 comprimidos </td> <td>A cada 20 kg</td> </tr> <tr> <td>A partir do 2º dia de tratamento</td> <td>1 comprimido </td> <td>A cada 20 kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>A duração do tratamento dependerá da gravidade da doença. Em cães, administrar em até 14 dias consecutivos. A dose, a frequência e o tempo de tratamento podem ser alterados de acordo com as orientações do médico veterinário.</p>	Espécie	Dias de tratamento	Comprimidos	Peso do animal	Cães 	No 1º dia de tratamento	2 comprimidos 	A cada 20 kg	A partir do 2º dia de tratamento	1 comprimido 	A cada 20 kg
Espécie	Dias de tratamento	Comprimidos	Peso do animal									
Cães 	No 1º dia de tratamento	2 comprimidos 	A cada 20 kg									
	A partir do 2º dia de tratamento	1 comprimido 	A cada 20 kg									
MODO DE USAR	Administrar por via oral, uma vez ao dia, diretamente na boca do animal.											
FARMACOCINÉTICA	<p>Em cães, o meloxicam apresenta boa absorção após a administração oral. Os níveis sanguíneos máximos ocorrem cerca de 7 a 8 horas após administração. O volume de distribuição em cães é de 0,3 l/kg, com 97% das proteínas ligadas. O meloxicam é extensamente biotransformado em diversos metabólitos no fígado. A eliminação ocorre via fezes. Há uma quantidade significativa da recirculação entero-hepática desse produto. A meia-vida de eliminação em cães é em média de 24 horas, com intervalo de 12 a 36 horas.</p> <p>Em gatos a meia-vida do meloxicam é de 21 horas, com volume de distribuição de 0,24 l/kg, sendo altamente ligado às proteínas.</p> <p>A metabolização ocorre no fígado para formar conjugados de glucuronido. A maioria dos metabólitos é eliminado nas fezes.</p>											
FARMACODINÂMICA	O MeloxiPro é um fármaco anti-inflamatório não esteroide (AINE). Como outras drogas nessa classe, o meloxicam tem efeitos analgésicos e anti-inflamatórios, inibindo a síntese de prostaglandinas. A enzima inibida pelo AINE é a enzima ciclo-oxigenase (COX). A enzima COX existe em duas isoformas: COX-1 e COX-2. A COX-1 é principalmente responsável pela síntese de prostaglandinas importantes para manter um trato GI saudável, função renal, função plaquetária e outras funções normais. A COX-2 é induzida e responsável por sintetizar prostaglandinas que são mediadores importantes da dor, inflamação e febre. O meloxicam é considerado COX-2 preferencial (não COX-2 específico), pois em doses mais elevadas a sua especificidade COX-2 é diminuída.											

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	Como o meloxicam se liga altamente às proteínas plasmáticas, pode se deslocar ou ser deslocado por outras drogas altamente ligadas também às proteínas, incluindo varfarina e fenilbutazona. Devido ao risco de causar ulceração gastrointestinal, quando usado com outros medicamentos que alterem a hemostasia (heparina, varfarina) e/ou que causem erosão gastrointestinal (aspirina, flunixin, fenilbutazona, corticosteroides), aumentam a probabilidade de sangramento ou ulceração.
SEGURANÇA	O medicamento não deve ser administrado a animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula.
PRECAUÇÕES	A dose, frequência e duração devem ser avaliadas pelo Médico Veterinário para serem ajustadas de acordo com o quadro clínico do paciente.
CONTRAINDICAÇÕES	<p>O produto não deve ser administrado em cães hipersensíveis a qualquer componente da fórmula.</p> <p>Os animais que apresentem ulceração ou sangramento gastrointestinal, insuficiência hepática, cardíaca ou renal e distúrbios hemorrágicos não devem ser medicados com o MeloxiPro.</p> <p>Evitar a administração em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos, visto que existe um risco potencial de toxicidade renal.</p> <p>O medicamento não possui estudos em animais jovens, prenhes e/ou lactantes.</p>
EFEITOS COLATERAIS / REAÇÕES ADVERSAS	Os efeitos adversos mais relatados estão relacionados a desconfortos gastrointestinais, como vômitos, diarreia e ulcerações. Entretanto, esses efeitos ocorrem ocasionalmente e de forma transitória.
CONSERVAÇÃO	Conservar a embalagem fechada, em temperatura ambiente (15-30°C), ao abrigo da luz solar e da umidade, fora do alcance de crianças e animais domésticos.
APRESENTAÇÃO	<p>Comprimido de 150mg contendo 0,5 mg de ativo para cães.</p> <p>Cartucho com blister de 10 comprimidos;</p> <p>Display com 6 blisters de 10 comprimidos cada;</p> <p>Display com 12 blisters de 10 comprimidos cada;</p> <p>Display com 24 blisters de 10 comprimidos cada;</p>