

ProvetS[®]
Simões



Prevempet

Talco

Tratamento das infestações por
pulga, piolho e carrapatos

USO EXCLUSIVO VETERINÁRIO

Peso Líq. : **100g**

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Permetrina	1,00 g
Ácido Bórico	2,00 g
Excipiente q.s.p.	100,00 g

Cuidado  Veneno

Modo de usar:

USO EXCLUSIVAMENTE EXTERNO. Pulverizar o Prevempet Talco sobre todo o corpo do animal, espalhando com uma escova, de modo que o produto entre em contato com a pele. Recomenda-se aplicar também nos locais de permanência do animal. Uma aplicação semanal é suficiente para controlar as reinfestações. Usar luvas protetoras para a aplicação do produto.

Advertências:

Não utilizar a embalagem vazia.

Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e cosméticos.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Piretrinas.

Antídoto: Não há antídoto específico, somente tratamento sintomático e de manutenção.

Telefone de Emergência: Centro de Informações Toxicológicas (21) 2270-0295 (Sinitox - FioCruz)

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E PRIMEIROS SOCORROS:

EVITAR ASPIRAR O PRODUTO. EVITAR APLICAÇÕES NAS ÁREAS PRÓXIMAS AOS OLHOS E NARINAS. PRODUTO TÓXICO PARA PEIXES, ABELHAS E PÁSSAROS. EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL NÃO HÁ ANTÍDOTO ESPECÍFICO, O TRATAMENTO É FEITO PELOS SINTOMAS CLÍNICOS DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

O PRODUTO É IRRITANTE PARA OS OLHOS, OCORRENDO CONTATO DO PRODUTO COM OS OLHOS E COM A PELE, LAVE-OS IMEDIATAMENTE.

CUIDADOS NO MANUSEIO DO PRODUTO: USE LUVAS DE BORRACHA.

EM CASO DE DÚVIDAS E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO LIGAR PARA SAC: (21) 2502-7000.

Em caso de ingestão acidental do produto o tratamento será sintomático.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO.

Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original.

CONTRAINDICAÇÕES: ESTE PRODUTO É CONTRA INDICADO EM CADELAS GESTANTES, ANIMAIS IDOSOS E DEBILITADOS.

ADVERTÊNCIAS ENVOLVENDO HUMANOS:

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água corrente em abundância por 15 minutos no mínimo, levantando e abaixando a pálpebra superior ocasionalmente.

EFEITOS COLATERAIS E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: NÃO POSSUI.

Conservar a embalagem bem fechada, em temperatura ambiente (15-30°C), ao abrigo da luz solar e da umidade, fora do alcance de crianças e animais domésticos.