

O Provex é composto por Praziquantel, Pirantel e Febantel, ingredientes com ampla margem de segurança e excelente ação anti-helmíntica que atua contra as formas larvares e adultas de cestódeos, nematódeos que acometem os cães.

FÓRMULA	<p>Cada comprimido de 600 mg contém:</p> <p>Praziquantel 0,050 g Pamoato de Pirantel 0,144 g Febantel 0,150 g Excipientes q.s.p. 0,600 g</p>
INDICAÇÕES	<p>Vermífugo de amplo espectro para cães, que age contra as formas adultas e larvares dos seguintes cestódeos e nematódeos: <i>Ancylostoma caninum</i>, <i>Echinococcus multilocularis</i>, <i>Joyeuxiella pasqualei</i>, <i>Mesocestoides spp.</i>, <i>Multiceps multiceps</i>, <i>Taenia hydatigena</i>, <i>Taenia pisiformis</i>, <i>Taenia ovis</i>, <i>Toxocara canis</i>, <i>Toxascaris leonina</i>, <i>Uncinaria stenocephala</i>, <i>Trichuris vulpis</i>.</p>
MODO DE USAR E POSOLOGIA	<p>Administrar o medicamento por via oral em dose única. O comprimido pode ser misturado a ração ou a carne, dispensando regime especial ou jejum prévio. Administrar 1 comprimido para cada 10 Kg de peso do animal fracionando-o quando necessário, realizando a pesagem do animal previamente.</p> <p>Para uma completa vermifugação, repetir a dose 21 dias depois.</p> <p>Animais adultos podem ser vermifugados de 3 a 4 vezes ao ano.</p> <p>Obs.: Recomenda-se o tratamento com antipulgas no ambiente e no animal para prevenir reinfestação de <i>Dipylidium caninum</i>, onde as pulgas são hospedeiros intermediários.</p>
EFEITOS COLATERAIS	<p>Doses excessivas de Praziquantel induzem anorexia, vômitos, salivação, diarreia e letargia em menos de 5% dos animais que recebem a droga.</p> <p>Não possui antídoto. Fazer tratamento sintomático.</p>
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	<p>O uso concomitante com dexametasona reduz a biodisponibilidade do praziquantel. Devido as suas propriedades colinérgicas à administração do pirantel em conjunto com outras drogas colinérgicas como o levamisol, pode levar a potencialização da sua toxicidade.</p> <p>Não usar medicamento a base de piperazina devido a ação antagônica ao pamoato de pirantel.</p>
CONTRAINDICAÇÕES	<p>O pirantel não é recomendado para animais gravemente debilitados, presumivelmente porque sua ação farmacológica (propriedades semelhantes a nicotina) é mais pronunciada nesses hospedeiros.</p>
APRESENTAÇÃO	<p>Caixa com 1 strip de 4 comprimidos de 600 mg, Display com 25 strips de 4 comprimidos de 600 mg cada.</p>

Conservar a embalagem bem fechada, em temperatura ambiente (15-30°C), ao abrigo da luz solar e da umidade, fora do alcance de crianças e animais domésticos.