

Tratamento a prevenção das sarnas em cães e gatos.

FÓRMULA	Cada 100 mL contém: Monossulfureto de tetraetiltiuram 5,00 g Veículo q.s.p. 100,00 mL
INDICAÇÕES	Tratamento e controle das sarnas dos cães e gatos que acometem diversas regiões do corpo. Atua nas mais diferentes espécies de sarna: Sarna Sarcóptica: (<i>Sarcoptes scabiei</i>) suas lesões iniciam-se na cabeça e espalham-se pelo corpo dos cães; Sarna Demodéica: (<i>Demodex canis</i>) auxilia no tratamento da sarna demodéica. Sarna Otodéica: (<i>Otodectis cynotis</i>) atingem cães e gatos acometendo o pavilhão auricular desses animais podendo gerar um quadro clínico de otite externa. Sarna Notoédrica: (<i>Notoedres cati</i>) as lesões se iniciam no pavilhão auditivo, podendo ainda, evoluir para a face do animal. O produto, após a diluição em água, pode ser instilado no conduto auditivo tratando e debelando a infestação parasitária.
MODO DE USAR	Uso exclusivamente externo, na região afetada e seus arredores. Não usar o produto sem ser diluído. Diluir a quantidade necessária para uma aplicação, em igual quantidade de água e aplicar com o auxílio de um cotonete, gaze ou algodão limpo, tomando o cuidado para que o produto entre em contato com a pele. Nos casos de sarnas que acometem o pavilhão auricular, realizar prévia limpeza do conduto auditivo e instilar de 3 a 4 gotas do produto no local. As aplicações devem ser diárias até desaparecerem as lesões ou a critério do médico veterinário.
APRESENTAÇÃO	Frasco de vidro âmbar de 30 mL, 60 mL, 90 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL e 1000 mL.

Cuidado  **Veneno**

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Derivados de enxofre

ANTÍDOTO: Produto de baixa toxicidade. Não existe antídoto específico.

PRIMEIROS SOCORROS EM CASO DE ACIDENTE:

Em contatos com mucosas lavar com água e sabão. Caso ocorra ingestão em grande quantidade provocar vômito caso o acidentado esteja consciente. Informação ao médico: produto inibe o metabolismo oxidativo do álcool etílico, por isso não se deve ingerir álcool após seu manuseio. O uso de álcool com produto provoca vasodilatação, taquicardia, náuseas, vômitos, calor e hipertensão. Síndrome aldeído-acético.

Telefone de Emergência: Centro de Informações Toxicológicas (21) 2270-0295 (Sinitox-FioCruz)

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E PRIMEIROS SOCORROS: O PRODUTO É IRRITANTE PARA OS OLHOS, OCORRENDO CONTATO DO PRODUTO COM OS OLHOS, LAVE-OS IMEDIATAMENTE.

CUIDADOS NO MANUSEIO DO PRODUTO: USE LUVAS DE BORRACHA.

EM CASO DE DÚVIDAS E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO LIGAR PARA SAC: (21) 2502-7000.

Em caso de ingestão acidental do produto o tratamento será sintomático.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO. NÃO USE A EMBALAGEM VAZIA. NÃO GUARDE OU APLIQUE JUNTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, MEDICAMENTOS, PRODUTOS DE HIGIENE E DOMÉSTICOS.

Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original.

CONTRAINDICAÇÕES: ESTE PRODUTO É CONTRA INDICADO EM CADELAS GESTANTES, ANIMAIS IDOSOS E DEBILITADOS.

ADVERTÊNCIAS ENVOLVENDO HUMANOS:

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água correndo em abundância por 15 minutos no mínimo, levando e abaixando a pálpebra superior ocasionalmente.

EFEITOS COLATERAIS E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: NÃO POSSUI.

Conservar a embalagem bem fechada, em temperatura ambiente (15-30°C), ao abrigo da luz solar e da umidade, fora do alcance de crianças e animais domésticos.