

Tratamento e prevenção das sarnas em cães e gatos.	
FÓRMULA	Cada 100 g contém: Monossulfureto de tetraetiltiuram 2,5 g Excipiente q.s.p. 100,0 g
INDICAÇÕES	Tratamento e controle das sarnas dos cães e gatos que acometem diversas regiões do corpo. Atua nas mais diferentes espécies de sarna: Sarna Sarcóptica: (<i>Sarcoptes scabiei</i>) suas lesões iniciam-se na cabeça e espalham-se pelo corpo dos cães; Sarna Demodécica: (<i>Demodex canis</i>) auxilia no tratamento da sarna demodécica ; Sarna Otodécica: (<i>Otodectis cynotis</i>) atingem cães e gatos acometendo o pavilhão auricular desses animais podendo gerar um quadro clínico de otite externa. Sarna Notoédrica: (<i>Notoedres cati</i>) as lesões se iniciam no pavilhão auditivo, podendo ainda, evoluir para a face do animal.
MODO DE USAR	Uso exclusivamente externo, em aplicações dermatológicas. Cobrir toda a lesão com uma camada fina de Sarnavet Pomada, abrangendo também as imediações, usando um pincel macio ou espátula. Se possível, fazer uma leve massagem no local medicado. Realizar aplicações dermatológicas periódicas ou a critério do médico veterinário. Não guardar ou aplicar perto de alimentos, bebidas ou produto de higiene doméstica.
APRESENTAÇÃO	Bisnaga contendo 30g.
Cuidado  Veneno	
<p>INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO: Grupo Químico: Derivados de enxofre ANTÍDOTO: Produto de baixa toxicidade. Não existe antídoto específico. PRIMEIROS SOCORROS EM CASO DE ACIDENTE: Em contatos com mucosas lavar com água e sabão. Caso ocorra ingestão em grande quantidade provocar vômito caso o acidentado esteja consciente. Informação ao médico: produto inibe o metabolismo oxidativo do álcool etílico, por isso não se deve ingerir álcool após seu manuseio. O uso de álcool com produto provoca vasodilatação, taquicardia, náuseas, vômitos, calor e hipertensão. Síndrome aldeído-acético. Telefone de Emergência: Centro de Informações Toxicológicas (21) 2270-0295 (Sinitox-FioCruz) PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E PRIMEIROS SOCORROS: O PRODUTO É IRRITANTE PARA OS OLHOS, OCORRENDO CONTATO DO PRODUTO COM OS OLHOS, LAVE-OS IMEDIATAMENTE. CUIDADOS NO MANUSEIO DO PRODUTO: USE LUVAS DE BORRACHA. EM CASO DE DÚVIDAS E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO LIGAR PARA SAC: (21) 2157-5757 Em caso de ingestão acidental do produto o tratamento será sintomático. MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO. NÃO USE A EMBALAGEM VAZIA. NÃO GUARDE OU APLIQUE JUNTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, MEDICAMENTOS, PRODUTOS DE HIGIENE E DOMÉSTICOS. Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. CONTRAINDICAÇÕES: ESTE PRODUTO É CONTRA INDICADO EM CADELAS GESTANTES, ANIMAIS IDOSOS E DEBILITADOS. ADVERTÊNCIAS ENVOLVENDO HUMANOS: Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água correndo em abundância por 15 minutos no mínimo, levando e abaixando a pálpebra superior ocasionalmente. EFEITOS COLATERAIS E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: NÃO POSSUI.</p>	
<p>Conservar a embalagem bem fechada, em temperatura ambiente (15-30°C), ao abrigo da luz solar e da umidade, fora do alcance de crianças e animais domésticos.</p>	